

Ficha da espécie

Erigeron sumatrensis

Dados do registo na Flora Digital de Portugal

Imagem de capa

Espécie: *Erigeron sumatrensis*

Descritor: Retz.

Família: Asteraceae

Ordem: Asterales

Sub-classe: Magnoliopsida

Classe: Asteridae

Sub-divisão: Magnoliophytina (Angiospermae)

Divisão: Spermatophyta

Tipo Fisionómico: Caméfito

Distribuição Geral: Oriunda da América do S, subespontânea na Europa

Nome Comum: Avoadinha-branca-de-pêlos-compridos; Avoadinha-marfim;

Habitat/Ecologia: Terrenos cultivados
Ruderal



Sinonímias: *Conyza albida* Willd. ex Spreng.; *Conyza albida* Spreng.; *Conyza sumatrensis* (Retz.) E.Walker; *Aster ambiguus* E.H.L.Krause; *Baccharis ivifolia* Blanco; *Conyza altissima* Naudin ex Debeaux; *Conyza ambigua* DC.; *Conyza bonariensis* var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera; *Conyza bonariensis* f. *subleiotheca* Cuatrec.; *Conyza daveauana* Sennen; *Conyza erigeroides* DC.; *Conyza flahaultiana* (Thell.) Sennen; *Conyza floribunda* var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J.B.Marshall; *Conyza gracilis* Hoffmanns. & Link; *Conyza groegeri* V.M.Badillo; *Conyza naudinii* Bonnet; *Dimorphanthes ambigua* C.Presl; *Dimorphanthes floribunda* Cass.; *Erigeron ambiguus* Sch.Bip., P.B.Webb & S.Berthelot; *Erigeron bonariensis* var. *microcephalus* Cabrera; *Erigeron crispus* subsp. *naudinii* (Bonnet) Bonnier; *Erigeron daveauanus* (Sennen) Greuter; *Erigeron flahaultianus* Thell.; *Erigeron musashensis* Makino; *Erigeron naudinii* (Bonnet) Humbert; *Eschenbachia ambigua* Moris;

Época Floração: Julho - Novembro

No JB-UTAD: Não existente.

Colecção temática: Não pertence a nenhuma colecção.

Utilização e acesso

As informações constantes neste documentos foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD**. A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização da Flora Digital de Portugal em <http://jb.utad.pt/termos>.